



# Guía para conocer las aves de Jaaukanigás

Por Pablo Capovilla

Jaaukanigás






Se ubica al noreste de la provincia de Santa Fe y cuenta con una superficie de **492.000ha**.

Limita al norte con la provincia de Chaco, al oeste con la Ruta Provincial 1 y la Ruta Nacional 11; al sur con el arroyo Malabriga y al este con el canal de navegación del río Paraná, límite con la provincia de Corrientes.

En lengua abipona «Jaaukanigás» significa «gente del agua».



AVES ARGENTINAS





Esta recopilación de las especies de aves registradas en el Sitio Ramsar Jaaukanigás surge del trabajo llevado adelante por el equipo de la ONG Aves Argentinas, bibliografía publicada y la información disponible en las plataformas de ciencia ciudadana, como así también de entrevistas realizadas a observadores locales.



En el recorrido de este material de distribución gratuita, podrás encontrar enlaces a diferentes plataformas y páginas de uso público. Agradecemos a quienes colaboran para seguir construyendo la ciencia ciudadana.



- ↳ Para ayudarte a identificar a las aves, en esta guía encontrarás un enlace Ebird.org para cada especie, donde hay mas información, registros en el Departamento **General Obligado**, vocalizaciones, fotos y videos.
  
- ↳ Podés buscarlas por nombre común o científico en el buscador del lector de pdf. ↗



# Chingolo (*Zonotrichia capensis*)

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

## FOTOS REPRESENTATIVAS DE LA ESPECIE

Algunas con flechas para indicar detalles de interés para identificar



COMÚN

SI ES COMÚN, POCO COMÚN O RARA DE VER EN JAAUKANIGÁS  
(el color de fondo acompaña esta clasificación)

COMENTARIO SOBRE LA ESPECIE

Presente en todo el sitio, muy vocalizador.

LINK CON MÁS INFORMACIÓN DE LA ESPECIE, REGISTROS Y AUDIOS EN EL DEPTO. G. OBLIGADO

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí



# HASTA SEPTIEMBRE DEL 2025 EN JAAUKANIGÁS SE REGISTRARON **336** ESPECIES DE AVES. AQUÍ TE LAS PRESENTAMOS :

Al final de esta guía también tenés enlaces para ver mariposas, plantas, anfibios, reptiles, mamíferos y hongos, registrados para este sitio Ramsar en la plataforma Argentinat.



# Ñandú (*Rhea americana*)



**RARO**

Pocos registros  
en grandes  
pastizales y  
cultivos del  
Norte del sitio.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tataupá Montaraz (*Crypturellus tataupa*)

COMÚN



Más escuchado  
que visto, en  
bosques  
densos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Colorado (*Rhynchotus rufescens*)



F: Ré Pablo



F: Ré Pablo

**COMÚN**

Más escuchada  
que vista, en  
pastizales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Inambú Campestre (*Nothura maculosa*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



F: Zingerling Maria



F: Capovilla Pablo

Más escuchada  
que vista, en  
pastizales y  
sembrados.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Chajá (*Chauna torquata*)



F: Capovilla Pablo



F: Zingerling Maria



F: Zingerling Maria

**COMÚN**

Por lo general  
en pareja o  
grupos.  
Pueden volar  
muy alto.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Sirirí Pampa (*Dendrocygna viduata*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



F: Zingerling Maria

Vuelan por las noches vocalizando. En pareja o grupos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Sirirí Vientre Negro (*Dendrocygna autumnalis*)

COMÚN



Puede formar bandadas mixtas con otros patos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Sirirí Colorado (*Dendrocygna bicolor*)



**COMÚN**

En humedales.  
Vuelan por las  
noches  
vocalizando.  
Pueden  
juntarse en  
grupos  
grandes.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Cisne Cuello Negro (*Cygnus melancoryphus*)



RARO

En humedales  
grandes. Más  
abundante en  
invierno.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí



# Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*)



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

**POCO  
COMÚN**

En humedales.  
En pareja o  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

**Click Aquí**

# Pato Crestudo (*Sarkidiornis sylvicola*)



F: Ré Pablo



RARO

Grande, vuela  
en fila. En  
peligro de  
extinción a  
nivel nacional.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pato Real (*Cairina moschata*)



F: La Grotteria Jorge



RARO


Domesticado  
en algunos  
poblados.

Habita  
humedales. En  
peligro a nivel  
nacional.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pato de Collar (*Callonetta leucophrys*)



COMÚN

En pareja o grupos. Puede nidificar en nidos de cotorras.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí



# Pato Cutirí (*Amazonetta brasiliensis*)

COMÚN



En pareja o  
pequeños  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pato Capuchino (*Spatula versicolor*)



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

COMÚN


En pareja o  
pequeños  
grupos, en  
lagunas y  
esteros.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pato Cuchara (*Spatula platalea*)

♂



F: Ré Pablo

♀



POCO  
COMÚN

Pico negro.  
Ojos claros en  
el macho y  
oscuros en la  
hembra

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:



F: Ré Pablo

Click Aquí

# Pato Gargantilla (*Anas bahamensis*)



RARO

Más  
abundante en  
invierno. En  
pareja o en  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: La Grotteria Jorge

Click Aquí

# Pato Colorado (*Spatula cyanoptera*)



F: Capovilla Pablo



F: Ré Pablo

**RARO**

Suele andar en  
pareja o  
pequeños  
grupos

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pato Maicero (*Anas georgica*)



F: Capovilla Pablo



F: González Mora Gonzalo

**RARO**

Suele andar en  
pareja o  
pequeños  
grupos

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Pato Barcino (*Anas flavirostris*)



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo



**POCO  
COMÚN**


Suele nidificar dentro de nidos de cotorras.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pato Picazo (*Netta peposaca*)

COMÚN





Suele pasar volando en grandes bandadas.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Pato Cabeza Negra (*Heteronetta atricapilla*)



**POCO  
COMÚN**

Parásito de  
puesta. Nada  
junto a  
gallaretas,  
pollonas y  
otros patos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Pato Fierro (*Nomonyx dominicus*)



**POCO  
COMÚN**

En pequeños  
grupos en  
lagunas con  
vegetación.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pato Zambullidor Chico (*Oxyura vittata*)



RARO

Puede estar  
junto al Pato  
Fierro, en  
pequeños  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Charata (*Ortalis canicollis*)



COMÚN

Inconfundible,  
su particular  
vocalización se  
escucha a  
distancia.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

NT

# Flamenco Austral (*Phoenicopterus chilensis*)



F: Ré Pablo



F: La Grotteria Jorge

POCO  
COMÚN

Más  
abundante  
en invierno

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Macá Cara Blanca (*Rollandia rolland*)



POCO  
COMÚN

Buceador, en  
pequeños  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Macá Pico Grueso (*Podilymbus podiceps*)

POCO  
COMÚN



Solitario o en pareja, bucea para conseguir su alimento.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Macá Grande (*Podiceps major*)



RARO

Solitario o en  
pareja, recorre  
aguas  
profundas.



F: Ré Pablo

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

F: Capovilla Pablo

# Paloma Bravía/Doméstica (*Columba livia*)



**COMÚN**

**EXÓTICA**

Más  
abundante  
en zonas  
urbanas.

Más fotos,  
cantos y mapa  
de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Paloma Colorada (*Patagioenas cayennensis*)



F: La Grotteria Jorge



F: La Grotteria Jorge

RARA

Un solo  
registro en el  
sitio. Se  
distingue por  
su plumaje  
rojizo y canto.

Más fotos,  
cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Paloma Picazuró (*Patagioenas picazuro*)

COMÚN



Paloma  
grande. Posee  
un canto fácil  
de reconocer.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Paloma Manchada (*Patagioenas maculosa*)

F: Battistino Ricardo



F: La Grotteria Jorge



COMÚN

Tanto en la  
ciudad como  
en el campo.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Torcacita Colorada (*Columbina talpacoti*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

Puede formar  
grupos con  
otras  
palomas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Torcacita Escamada (*Columbina squammata*)

F: La Grotteria Jorge



**RARA**

Primer registro  
en enero del  
2022.  
Poblaciones en  
aumento.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Torcacita Picuí (*Columbina picui*)



**COMÚN**

En el piso en  
caminos  
rurales y zonas  
abiertas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Yerutí Gris (*Leptotila verreauxi*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo

En bosques,  
caminadora,  
muy  
escuchada.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Torcaza (*Zenaida auriculata*)



**COMÚN**

Abundante en el campo y la ciudad. Es la paloma nativa mas común.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Pirincho (*Guira guira*)

F: Capovilla Pablo



F: Battistino Ricardo



F: Capovilla Pablo

**COMÚN**

En grupos,  
tanto en la  
ciudad como  
en el campo.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Anó Grande (*Crotophaga major*)



F: La Grotteria Jorge



F: Ré Pablo



F: Capovilla Pablo

**POCO  
COMÚN**

En primavera / verano.  
Tamaño grande, de vocalización llamativa.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Anó Chico (*Crotophaga ani*)



F: Nagel Federico



F: Battistino Ricardo



F: Capovilla Pablo

**COMÚN**


En grupos,  
recorren los  
bordes de ríos  
y lagunas,  
también  
campos  
abiertos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Crespín (*Tapera naevia*)

F: Nagel Federico



## COMÚN

Abundante en  
Primavera /  
verano.

Más  
escuchado que  
visto.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

**juvenil**

F: Capovilla Pablo



F: Micelli Jorge



F: Micelli Jorge

[Click Aquí](#)

# Cucalito Chico (*Coccycua cinerea*)



F: Capovilla Pablo



F: Beltrocco Eduardo

**POCO  
COMÚN**

En primavera /  
verano

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tingazú (*Piaya cayana*)



POCO  
COMÚN

Inconfundible.  
Cola muy larga.  
Por lo general  
solitario.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cuclillo Canela (*Coccyzus melacoryphus*)



F: Ré Pablo



F: Capovilla Pablo

**COMÚN**

Primavera /  
verano

Más escuchado  
que visto.  
Sigiloso.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cuclillo Pico Amarillo (*Coccyzus americanus*)



F: Battistino Ricardo



F: Nagel Federico

RARO

Primavera /  
verano.  
Bosques  
densos, pico  
de base  
amarilla.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Ñacundá (*Chordeiles nacunda*)

F: Nagel Federico



F: Capovilla Pablo

F: Micelli Jorge



## COMÚN

Vuelan en grupos al atardecer, en áreas abiertas y pastizales.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Añapero Boreal (*Chordeiles minor*)



F: Simpkins Kathlin

F: La Grotteria Jorge

RARO

Puede formar bandas mixtas con el anterior. Suele posarse en arboles.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Atajacaminos Ñañarca (*Systellura longirostris*)

RARO

F: Zingerling Maria



Vuelan de noche. Si está nublado chocan con estructuras y pueden caer en ciudades

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

F: Zingerling Maria

F: Zingerling Maria

# Curiango (*Nyctidromus albicollis*)



F: Capovilla Pablo



F: Nagel Federico



F: Capovilla Pablo

**POCO  
COMÚN**

Vocalización  
muy  
distingüible en  
la noche.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Atajacaminos Chico (*Setopagis parvula*)



COMÚN

Nocturno, muy  
vocalizador.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Atajacaminos Tijera (*Hydropsalis torquata*)



COMÚN

Nocturno,  
abundante y  
de espacios  
abiertos.  
Macho con  
cola larga.

F: Zapata Ignacio



Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

F: Nagel Federico

# Atajacaminos Colorado (*Antrostomus rufus*)

F: La Grotteria Jorge




F: La Grotteria Jorge



RARO

En el norte del sitio. Muy vocalizador al anochecer en bosques chaqueños.



F: Capovilla Pablo

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Urutaú (*Nyctibius griseus*)

F: Capovilla Pablo



**COMÚN**

Primavera/  
verano. Difícil  
de ver, su  
canto es  
inconfundible.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

F: Capovilla Pablo

# Picaflor de Barbijo (*Heliomaster furcifer*)

**POCO  
COMÚN**

Grande, de pico negro y largo. Se lo suele ver en los ceibos y lapachos florecidos.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

F: Enrique Jesús




♀



F: Battistino Ricardo

F: Capovilla Pablo



# Picaflor Verde (*Chlorostilbon lucidus*)

F: Capovilla Pablo

♂



♀



COMÚN

Tanto en el  
campo como  
en la ciudad.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

F: Ré Pablo

# Picaflor Bronceado (*Hylocharis chrysura*)

COMÚN

F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo



Abundante,  
muy  
vocalizador y  
territorial.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:



F: Ré Pablo

Click Aquí

# Burrito Grande (*Mustelirallus albicollis*)



F: Ré Pablo



F: Nagel Federico

POCO  
COMÚN

Mas oído que  
visto, canto  
fácil de  
distinguir.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Gallineta Overa (*Pardirallus maculatus*)

COMÚN



F: Ré Pablo

Vuelan de noche. Si está nublado chocan con estructuras y pueden caer en ciudades

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Gallineta Pico Pintado (*Pardirallus sanguinolentus*)

## COMÚN



Vuelan de noche. Si está nublado chocan con estructuras y pueden caer en ciudades.

Muy escuchada en juncales.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Ipacaá (*Aramides ypecaha*)

COMÚN



F: Beltrocco Eduardo



F: Beltrocco Eduardo

Grande. En  
humedales y  
sus  
alrededores.

Muy  
vocalizador.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Chiricote (*Aramides cajaneus*)

F: La Grotteria Jorge



F: Capovilla Pablo

Capovilla Pablo H.



**POCO  
COMÚN**

Más pequeño  
que el anterior  
y de nuca gris.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Pollona Pintada (*Porphyriops melanops*)



**COMÚN**

Vuelan de noche. Si está nublado chocan con estructuras y pueden caer en ciudades.

Más abundante en invierno.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Sager Maximiliano

[Click Aquí](#)

# Pollona Negra (*Gallinula galeata*)



**COMÚN**

Habita humedales vegetados. Vuelan de noche. Si está nublado chocan con estructuras y pueden caer en ciudades.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

# Gallareta Escudete Rojo (*Fulica rufifrons*)



**POCO  
COMÚN**

Vuelan de noche. Si está nublado chocan con estructuras y pueden caer en ciudades

Fotos, cantos y mapa de distribución:

# Gallareta Ligas Rojas (*Fulica armillata*)



**POCO  
COMÚN**

Vuelan de noche. Si está nublado chocan con estructuras y pueden caer en ciudades.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Gallareta Chica (*Fulica leucoptera*)



F: Ré Pablo



F: Ré Pablo

COMÚN

Vuelan de noche. Si está nublado chocan con estructuras y pueden caer en ciudades.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Pollona Azul (*Porphyrio martinica*)



**COMÚN**

En primavera y verano.

Vuelan de noche y si está nublado pueden chocar con estructuras y pueden caer en ciudades.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Pollona Celeste (*Porphyrio flavirostris*)



**RARA**

Pocos registros  
en la provincia.

Vuelan de  
noche. Si está  
nublado  
chocan con  
estructuras y  
pueden caer  
en ciudades.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Ré Pablo

[Click Aquí](#)

# Burrito Amarillo (*Hapalocrex flaviventer*)

RARO



F: Nagel Federico



13cm de alto.  
Vuela de noche.  
Si está nublado  
puede chocar  
con estructuras  
y por esto caer  
en ciudades.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Burrito Canela (*Laterallus melanophaius*)

COMÚN



Más  
escuchado que  
visto, en  
humedales con  
muchas  
vegetación.  
Vuela de  
noche.



F: Capovilla Pablo

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Carau (*Aramus guarauna*)



**COMÚN**

Muy  
vocalizador,  
mas grande  
que los  
cuervillos.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tero Real (*Himantopus mexicanus*)



**COMÚN**

En humedales  
y campos  
arados.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Chorlo Pampa (*Pluvialis dominica*)

RARO



Migrador. Se presenta en primavera verano, en playas y pastizales cortos y húmedos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Ré Pablo


Click Aquí

# Tero (*Vanellus chilensis*)

COMÚN



F: Zapata Ignacio



Tanto en el campo, como la ciudad. En áreas abiertas, a veces forma grandes grupos.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Chorlito de Collar (*Anarhynchus collaris*)

COMÚN



F: Ré Pablo



F: Ré Pablo

Playas  
de barro o  
arena, pasto  
corto húmedo.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Aguatero (*Nycticryphes semicollaris*)



RARO

Vuela de noche. Si está nublado choca con estructuras y puede caer en ciudades.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Jacana (*Jacana jacana*)



F: Battistino Ricardo



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

COMÚN

Juvenil con abundante blanco. Muy común en humedales vegetados.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Batitú (*Bartramia longicauda*)

RARO



F: Capovilla Pablo



F: Ré Pablo

Más  
abundante en  
verano,  
vocalizan en  
vuelo por las  
noches.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Becasa de Mar (*Limosa haemastica*)



F: González Laura

**RARO**

Playero grande  
de pico largo.  
Más  
abundante en  
verano, playas  
y costas.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

NT

# Playero Zancudo (*Calidris himantopus*)

RARO



En verano son más abundantes, en humedales. Playero de pico largo negro y patas largas amarillas.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Playerito Unicolor (*Calidris bairdii*)

RARO



En verano son  
más  
abundantes,  
en playas.  
Rabadilla  
partida y sin  
manchas en los  
flancos.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

vu

# Playerito Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*)



F: Ré Pablo



F: Capovilla Pablo

F: Capovilla Pablo

**POCO  
COMÚN**

En verano son  
más  
abundantes,  
en playas de  
lagunas y ríos..

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

vu

# Playerito Canela (*Calidris subruficollis*)

RARO



Primavera /  
verano, en  
pastizales  
cortos  
húmedos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Nagel Federico

Click Aquí

# Playerito Pectoral (*Calidris melanotos*)

COMÚN



F: Martín Claudio



Click Aquí

# Becasina de Bañado (*Gallinago paraguaiae*)

COMÚN



Más  
abundante en  
verano. Ruido  
llamativo al  
volar en  
círculos a  
media altura.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Falaropo Común (*Phalaropus tricolor*)



F: Battistino Ricardo



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

RARO

En verano son  
más  
abundantes.  
Nadadores en  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pitotoy Solitario (*Tringa solitaria*)



**COMÚN**

En verano son  
más  
abundantes.  
Patas verdosas.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

NT

# Pitotoy Grande (*Tringa melanoleuca*)



F: Capovilla Pablo



COMÚN

En verano son  
más  
abundantes.  
Tamaño  
aproximado al  
de un Tero.  
Pico largo.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pitotoy Chico (*Tringa flavipes*)

COMÚN



En verano son  
más  
abundantes.  
En playas y  
bañados.

fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Gaviota Capucho Café (*Chroicocephalus maculipennis*)

POCO  
COMÚN




Puede formar  
bandadas con  
la gaviota  
Capucho Gris.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Gaviota Capucho Gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*)

COMÚN



F: Ré Pablo

F: González Laura

Suelen formar grandes grupos. Los plumajes invernales son muy difíciles de distinguir de la Gaviota Capucho Café.

Más info en :

Click Aquí

# Gaviotín de Río (*Sternula superciliaris*)



COMÚN

Pequeño, ágil,  
dorso bicolor.

Se tira en  
picada al agua  
para pescar.



Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Atí (*Phaetusa simplex*)

**COMÚN**



Más del doble  
del tamaño  
que el anterior.  
Dorso tricolor.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

F: Ré Pablo

E: Capovilla Pablo

# Rayador (*Rynchops niger*)



F: Zapata Ignacio



F: Battistino Ricardo

**COMÚN**

Inconfundible,  
suele andar en  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Cigüeña Americana (*Ciconia maguari*)

COMÚN



Grande, suele volar en térmicas. También llamada Tuyango.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Yabirú (*Jabiru mycteria*)

F: Capovilla Pablo

**COMÚN**



También  
llamado Juan  
Soldado,  
Doroteo,  
Tuyuyú Coral.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tuyuyú (*Mycteria americana*)

F: Capovilla Pablo



F: Battistino Ricardo

**COMÚN**

Suelen andar en grupos.  
Vuelan en térmicas con otras cigüeñas.  
También llamado Cabeza de Hueso en la zona.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Aninga (*Anhinga anhinga*)



F: González Laura



Zapata Ignacio

COMÚN

Pueden volar en térmicas bien alto con los jotes.  
Cuello y cola larga.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Biguá (*Nannopterum brasilianum*)

F: Capovilla Pablo



**juvenil**

**COMÚN**

Puede formar  
grandes  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Hocó Colorado (*Tigrisoma lineatum*)

F: Galván Carlos

**juvenil**



F: Battistino Ricardo



**COMÚN**

El juvenil suele  
confundirse  
con un Mirasol  
Grande.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Mirasol Grande (*Botaurus pinnatus*)



**POCO  
COMÚN**

Muy oculto en  
humedales  
bien  
vegetados,  
mas oído que  
visto.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Mirasol Estriado (*Ixobrychus involucris*)

POCO  
COMÚN



Pequeño, en  
juncales y  
totorales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Mirasol Chico (*Ixobrychus exilis*)



F: La Grotteria Jorge



F: La Grotteria Jorge

RARO

En grandes juncales y totorales, los registros en la zona son porque aparecieron individuos accidentalmente en la ciudad.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax*)

COMÚN

Gregaria y con mayor actividad por las noches, suele andar en grupos.



Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Chiflón (*Syrigma sibilatrix*)

COMÚN

En parejas o  
pequeños  
grupos.  
También en  
zonas urbanas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí



# Garcita Blanca (*Egretta thula*)



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

## COMÚN

Pico negro con la mandíbula clara, piernas dorsalmente negras, dedos amarillos.

51 – 55 cm de alto.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Garcita Azulada (*Butorides striata*)



**COMÚN**

Más  
abundante en  
primavera y  
verano  
Altura de 25 a  
40 cm.



Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Garcita Bueyera (*Ardea ibis*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

El color de patas puede variar, plumas nupciales marrones amarillentas. Altura de 47 a 51 cm.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Garza Blanca (*Ardea alba*)



F: García González Camilo



F: Palandri Franco

COMÚN

Altura de 85 a  
95 cm. Pico  
amarillo, patas  
enteramente  
negras.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Garza Mora (*Ardea cocoi*)

COMÚN



F: Beltrocco Eduardo



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

En diferentes  
humedales.  
Solitaria,  
arisca, grande  
con una altura  
entre 100 a  
125 cm.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cuervillo de Cañada (*Plegadis chihi*)

F: Capovilla Pablo



F: Pic Edgardo Oscar

F: Galván Carlos



F: Zingerling María

**COMÚN**

Patas  
sobrepasan la  
cola en vuelo.  
Suele formar  
grandes  
bandadas que  
vuelan en V.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Cuervillo Cara Pelada (*Phimosus infuscatus*)

COMÚN




Al volar las patas **no** sobrepasan la cola.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Bandurria Mora (*Theristicus caerulescens*)



POCO  
COMÚN

Fácil de  
distinguir por  
su forma,  
tamaño y  
vocalización.  
Solitaria o en  
pequeños  
grupos.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Espátula Rosada (*Platalea ajaja*)



F: Battistino Ricardo



COMÚN

Ambientes  
acuáticos. No  
son flamencos  
ni patos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Jote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*)

COMÚN

F: Battistino Ricardo

Nidifica en  
huecos de  
arboles, casas  
y galpones  
abandonados.  
Vuela alto en  
grupos  
aprovechando  
las térmicas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí



F: Churruarín Maximiliano




# Jote Cabeza Colorada (*Cathartes aura*)



F: Enrique Jesús



F: Ré Pablo



F: González Laura

**POCO  
COMÚN**

Fácil de  
distinguir por  
el color de su  
cabeza y alas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Jote Cabeza Amarilla Chico (*Cathartes burrovianus*)

COMÚN

F: Sager Maximiliano



Se distingue por su manera de volar y color de la cabeza.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

F: Sager Maximiliano

# Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)



F: Contreras Yanina



**POCO  
COMÚN**

Asociada a ambientes acuáticos profundos. Alas largas, abundante blanco.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Milano Chico (*Gampsonyx swainsonii*)

RARO



Bordes de selva  
y bosques.  
Pequeño, 20 a  
25 cm de  
altura.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: La Grotteria Jorge

F: La Grotteria Jorge

Click Aquí

# Milano Blanco (*Elanus leucurus*)

F: Ré Pablo



**juvenil**



## COMÚN

Áreas abiertas,  
también  
sembrados.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Zapata Ignacio

Click Aquí

# Aguilucho Pampa (*Busarellus nigricollis*)

COMÚN

F: González Laura



F: Battistino Ricardo



Asociado a  
ambientes  
acuáticos. Con  
babero negro  
y cara blanca.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*)

COMÚN



♂



♀



Suele formar grandes grupos que vuelan en térmicas. Pico muy característico.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Milano Boreal (*Ictinia mississippiensis*)

F: Zapata Ignacio



F: Capovilla Pablo



POCO  
COMÚN

En verano  
suelen volar  
en grupos.  
Alas: plumas  
primarias  
negruzcas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

F: Nagel Federico

# Milano Plomizo (*Ictinia plumbea*)

F: Luna Horacio



F: González Laura

**POCO  
COMÚN**

Primavera/  
verano,  
solitario o en  
parejas.  
Alas: plumas  
primarias  
castañas  
oscuras.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Gavilán Planeador (*Circus buffoni*)

F: Ré Pablo



F: Nagel Federico

**POCO  
COMÚN**

En pastizales y  
campos  
abiertos,  
también  
sembrados,  
vuelo lento y  
bajo.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Milano Pico Garfio (*Chondrohierax uncinatus*)

RARO



F: Petelski Carina



F: Ré Pablo

Un solo  
registro al  
Norte de la  
localidad de  
Las Toscas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Esparvero Estriado (*Accipiter striatus*)



POCO  
COMÚN

En bosques  
abiertos y  
bordes de  
selva.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Esparvero Variado (*Accipiter bicolor*)

F: Battistino Ricardo



POCO  
COMÚN

En bosques  
densos bien  
conservados.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Muñoz de Toro Juan

Click Aquí

# Gavilán Patas Largas (*Geranospiza caerulescens*)

F: Capovilla Pablo



F: Nagel Federico



POCO  
COMÚN

En bosques  
densos bien  
conservados.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Aguilucho Colorado (*Buteogallus meridionalis*)

F: García González Camilo

**juvenil**



F: Battistino Ricardo



F: Zapata Ignacio



F: Capovilla Pablo



## COMÚN

En diferentes  
ambientes,  
caminos  
rurales y  
costas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Águila Negra (*Buteogallus urubitinga*)

COMÚN



F: Battistino Ricardo



F: Zingerling María

Cerca de  
cursos de  
agua.  
Solitaria o en  
pareja.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí


# Taguató (*Rupornis magnirostris*)

**COMÚN**

F: Sager Maximiliano



F: Capovilla Pablo



Suele verse en  
caminos  
rurales y  
ciudades.

Muy  
vocalizador.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)


# Aguilucho Alas Largas (*Geranoaetus albicaudatus*)

**COMÚN**

Morfo oscura



F: Nagel Federico



Suelen posarse en postes de luz al costado de rutas y caminos.

**Morfo de color en plumajes. Alas mas largas que la cola.**

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



F: Battistino Ricardo



F: Capovilla Pablo

Suele posarse en postes de luz al costado de rutas y caminos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Aguilucho Langostero (*Buteo swainsoni*)

POCO  
COMÚN

F: Ré Pablo



F: Battistino Ricardo



Llegan en  
octubre hasta  
marzo en  
grandes  
bandadas.  
Variadas morfo  
de color.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí



F: Capovilla Pablo



F: Ré Pablo



F: Capovilla Pablo



# Lechuza de Campanario (*Tyto furcata*)



**COMÚN**

Controlan poblaciones de roedores, murciélagos y reptiles tanto en el campo como en la ciudad.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Alilicucú Común (*Megascops choliba*)

COMÚN



F: Palandri Franco



Controlan  
poblaciones de  
roedores,  
insectos,  
murciélagos y  
reptiles.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Ñacurutú (*Bubo virginianus*)



F: Ré Pablo



F: Capovilla Pablo

**COMÚN**

Grande: 55cm.  
Controlan  
poblaciones de  
roedores y  
reptiles, tanto  
en la ciudad  
como en el  
campo.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Caburé Chico (*Glaucidium brasilianum*)

COMÚN

F: Zapata Ignacio



F: González Laura



F: Capovilla Pablo

Distintas morfos de color (gris y rufa), es pequeño, silencioso y tanto nocturno como diurno.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Lechucita Vizcachera (*Athene cunicularia*)

COMÚN



F: Pic Edgardo Oscar



F: Culzoni Dante



F: Capovilla Pablo

Controlan  
poblaciones  
de roedores,  
insectos y  
reptiles. Son  
diurnas y  
nocturnas.

Más fotos,  
cantos y mapa  
de distribución:

Click Aquí

# Lechuzón Orejudo (*Asio clamator*)



**POCO  
COMÚN**


Controlan  
poblaciones  
de roedores,  
murciélagos y  
reptiles.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

F: Enrique Jesús

# Surucuá Cola Blanca (*Trogon surrucura*)



POCO  
COMÚN

Bosques en  
buen estado  
de  
conservación.  
Vocalización  
fácil de  
distinguir.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Martín Pescador Grande (*Megaceryle torquata*)

COMÚN



Gran tamaño.  
Los sexos  
difieren en el  
color de su  
plumaje. Muy  
vocalizadores.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Martín Pescador Mediano (*Chloroceryle amazona*)

COMÚN

♂



F: Nagel Federico

♀



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

Proporción  
pico - cabeza  
distinta al  
anterior.  
Hembra sin  
color canela.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Martín Pescador Chico (*Chloroceryle americana*)

COMÚN

♂



F: Ré Pablo

♀



F: Enrique Jesús

♀



F: Capovilla Pablo

Pequeño, de  
vuelo rápido al  
ras del agua.  
Asociado a  
ambientes  
acuáticos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Tucán Grande (*Ramphastos toco*)



**POCO  
COMÚN**

Inconfundible.  
Más  
abundante en  
invierno en la  
mitad Norte  
del sitio.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

# Carpinterito Barrado (*Picumnus cirratus*)

**COMÚN**



F: Ré Pablo

El más pequeño, muy vocalizador.  
Habita bosques, matorrales y también se encuentra en la ciudad.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*)

COMÚN

Suele andar en grupos de hasta 15 individuos. Se alimenta de panales de distintas abejas. Muy vocalizador..

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

F: Enrique Jesús

♂



F: Ré Pablo

♀




juvenil

F: Capovilla Pablo



# Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) COMÚN



Tanto en el campo como en la ciudad. Nidifican en troncos secos. Suelen andar en pequeños grupos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Carpintero Bataráz Chico (*Dryobates mixtus*)

COMÚN

♂



F: Ré Pablo

♀



F: Capovilla Pablo

Fácil de distinguir por su vocalización. Común en bosques pero también en zonas urbanas.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Carpintero Oliva Chico (*Dryobates passerinus*)

COMÚN

♂



F: Capovilla Pablo

♀





F: Sager Maximiliano

De unos 15cm,  
vocalizador.  
Habitante de  
bosques y  
tacuarales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Carpintero Lomo Blanco (*Campephilus leucopogon*)



POCO  
COMÚN

Suele andar  
en pareja.  
Tamaño  
grande: 35cm.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Carpintero Copete Pajizo (*Celeus lugubris*)

RARO



F: Sager Maximiliano



F: Capovilla Pablo

Bosques  
chaqueños  
bien  
conservados.  
Inconfundible  
por su  
coloración.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Carpintero Ojo Blanco (*Piculus chrysochloros*)



POCO  
COMÚN

Bosques  
densos bien  
conservados.  
Vocalización  
muy  
particular e  
inconfundible.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Carpintero Real (*Colaptes melanochloros*)

COMÚN



Tanto en el campo como en la ciudad.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Carpintero Campestre (*Colaptes campestris*)

COMÚN

F: Battistino Ricardo

♀



Áreas abiertas. En pareja o pequeños grupos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Chuña Patas Rojas (*Cariama cristata*)

RARA

Áreas  
abiertas.  
Caminadora.  
90 cm de  
altura.




Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Guaicurú (*Herpetotheres cachinnans*)



F: Ré Pablo



F: Capovilla Pablo

RARO

Bosques  
chaqueños  
bien  
conservados.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Halcón Montés Grande (*Micrastur semitorquatus*)

RARO



F: La Grotteria Jorge



F: Massa Luciano

Bosques  
densos y altos  
bien  
conservados.  
Muy  
vocalizador.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Carancho (*Caracara plancus*)



F: González Mora Gonzalo



**COMÚN**

Abundante.  
Suele andar  
en grupos.

Los juveniles  
difieren en el  
color de su  
plumaje con  
los adultos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Chimachima (*Daptrius chimachima*)

RARO



Los juveniles  
difieren en el  
color de su  
plumaje con  
los adultos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Sager Maximiliano

Click Aquí

# Chimango (*Daptrius chimango*)

**juvenil**



F: González Laura

F: Pic Edgardo Oscar



F: Capovilla Pablo

**POCO  
COMÚN**

Suele verse en  
campos  
sembrados y  
en la ciudad.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Halconcito Colorado (*Falco sparverius*)

**COMÚN**

♂



F: Ré Pablo

♀



F: Sager Maximiliano

♀



F: Capovilla Pablo

Los sexos  
difieren en el  
color de su  
plumaje.

Suelen  
nidificar en  
nidos de  
cotorra.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Halcón Plomizo (*Falco femoralis*)

POCO  
COMÚN



F: Braidotti Adrián



F: Braidotti Adrián

En ambientes  
abiertos,  
también  
sembrados.  
Más grande  
que el  
anterior.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)



**POCO  
COMÚN**

En primavera  
y verano,  
suele perchar  
en altas  
antenas y  
chimeneas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cotorra (*Myiopsitta monachus*)

**COMÚN**


Muy abundante en el campo y la ciudad. Grandes nidos en eucaliptus y también en torres y antenas.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)



F: Capovilla Pablo



# Loro Maitaca (*Pionus maximiliani*)



F: Nagel Federico



F: Muñoz de Toro Juan



F: Capovilla Pablo

POCO  
COMÚN

Solitario o en  
pareja, en  
bordes de  
bosques bien  
conservados.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Catita Enana (*Forpus xanthopterygius*)



F: Nagel Federico

**POCO  
COMÚN**

Pequeña, de  
vuelo muy  
rápido y muy  
vocalizadora.  
Hembra sin  
azul.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Chiripepé Cabeza Verde (*Pyrrhura frontalis*)



F: Capovilla Pablo



F: Luna Horacio

RARO

En el Norte del sitio.

Selvas y bosques chaqueños bien conservados.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Calancate Cabeza Azul (*Thectocercus acuticaudatus*)



F: Battistino Ricardo



F: Capovilla Pablo

**POCO  
COMÚN**

Suelen formar  
pequeños  
grupos, en  
palmares y  
bosques.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Calancate Ala Roja (*Psittacara leucophthalmus*)



F: Soria Marcos



F: Zapata Ignacio

## COMÚN

Suelen andar en grupos, a veces muy grandes. Distintivo rojo en sus alas en vuelo y también en cara y cuello.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Chororó (*Taraba major*)

COMÚN

♂



F: Ré Pablo

♀



F: Merlo Ana

Más  
escuchado  
que visto. En  
matorrales y  
bosques.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Choca Listada (*Thamnophilus doliatus*)



COMÚN

Los sexos difieren en el color de su plumaje. Muy vocalizadoras.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Choca Corona Negruzca (*Thamnophilus caerulescens*)

COMÚN



En bosques,  
tanto  
ribereños  
como  
chaqueños.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tarefero (*Sittasomus griseicapillus*)

**COMÚN**

Muy  
vocalizador y  
rápido.

Trepa troncos.  
Su cola  
termina en  
varias puntas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)



F: Sager Maximiliano

# Trepador Gigante (*Xiphocolaptes major*)



F: Nagel Federico



POCO  
COMÚN

En bosques y  
palmares.  
Trepa troncos.  
Tamaño  
grande.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Picapalo Colorado (*Campylorhamphus trochilirostris*)

**COMÚN**

Vocalizador,  
en bosques,  
tanto  
ribereños  
como  
chaqueños.  
Inconfundible  
por su pico.



Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Chinchero Grande (*Drymornis bridgesii*)



F: Zingerling Maria



F: Zapata Ignacio



F: Zapata Ignacio

COMÚN


Trepa troncos.  
Es común  
verlo en el  
suelo, áreas  
abiertas y  
también en la  
ciudad.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Chinchero Chico (*Lepidocolaptes angustirostris*)

COMÚN



F: Merlo Ana



Trepa troncos,  
se desplaza en  
planos  
verticales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Bandurrita Chaqueña (*Tarphonomus certhioides*)

POCO  
COMÚN



Matorrales  
densos en  
bosques  
chaqueños.

Más  
escuchada  
que vista.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Hornero (*Furnarius Rufus*)



**COMÚN**

El ave  
nacional. Muy  
vocalizador y  
abundante,  
tanto en el  
campo como  
en la ciudad.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Junquero (*Phleocryptes melanops*)



**COMÚN**

En humedales  
con juncos.

Muy  
vocalizador.  
Oculto en el  
juncal.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Remolinera Parda (*Cinclodes fuscus*)

POCO  
COMÚN



En otoño /  
invierno  
Costas de  
humedales.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Ticotico Estriado (*Syndactyla rufosuperciliata*)



F: Sager Maximiliano



F: Sager Maximiliano

POCO  
COMÚN

Más oído que visto. En bosques densos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Coludito Copetón (*Leptasthenura platensis*)

POCO  
COMÚN



En bosques  
chaqueños,  
muy  
vocalizador.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Espinero Chico (*Phacellodomus sibilatrix*)

COMÚN



En bosques  
abiertos del  
tipo  
chaqueño.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Espinero Pecho Manchado (*Phacellodomus striaticollis*)



F: Zapata Ignacio



F: Ré Pablo

RARO

Pastizales y  
banquinas en  
caminos  
rurales.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Espinero Grande (*Phacellodomus ruber*)



F: González Mora Gonzalo

COMÚN

Ojos bien amarillos.  
Suele estar en parejas. Canta a dúo.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

F: Battistino Ricardo

# Leñatero (*Anumbius annumbi*)

COMÚN



En pareja. En  
ambientes  
modificados.  
Muy  
vocalizadores.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Crestudo (*Coryphistera alaudina*)

F: Ré Pablo



**COMÚN**

En grupo,  
parques y  
áreas  
abiertas.

Suele  
desplazarse  
en el suelo.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Canastero Chaqueño (*Asthenes baeri*)

F: Ré Pablo



**POCO  
COMÚN**

En bosques  
chaqueños.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Canastero Coludo (*Asthenes pyrrholeuca*)

COMÚN



F: Nagel Federico



F: Ré Pablo

Otoño /  
Invierno  
Pastizales,  
totorales y  
juncales.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Curutié Blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*)



**POCO  
COMÚN**

En bosques  
chaqueños  
abiertos o  
borde de  
bosques.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*)

COMÚN



Suele estar en parejas tanto en el campo como en la ciudad.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Curutié Colorado (*Certhiaxis cinnamomeus*)

F: Battistino Ricardo



**COMÚN**

Más  
escuchado  
que visto.  
Ambientes  
acuáticos  
vegetados  
como  
totorales y  
junciales.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

F: Ré Pablo



# Chotoy (*Schoeniophylax phryganophilus*)

F: Ebel Andrés



F: Ré Pablo



COMÚN

Más  
escuchado que  
visto, caminos  
rurales.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pijuí Cola Parda (*Synallaxis albescens*)

F: Merlo Ana



F: Braidotti Adrián



**POCO  
COMÚN**

Más  
escuchado  
que visto.  
Áreas  
abiertas,  
caminos  
rurales.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Pijuí Frente Gris (*Synallaxis frontalis*)



COMÚN

Más  
escuchado  
que visto.  
Bosques y  
arbustales.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

F: Ré Pablo

# Cortarramas (*Phytotoma rutila*)

F: Nagel Federico



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

juvenil



## COMÚN

Más abundante en otoño / invierno.  
Áreas abiertas y caminos rurales.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*)

F: Capovilla Pablo

♂



F: Battistino Ricardo

♀



COMÚN

Primavera / verano. Muy vocalizadora y fácil de distinguir.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Anambé Verdoso (*Pachyramphus viridis*)



F: Nagel Federico



F: Zingerling Maria

**COMÚN**

Los sexos  
difieren en el  
color de su  
plumaje.  
Bosques y  
selvas.

Más fotos,  
cantos y mapa  
de distribución:

Click Aquí

# Anambé Negro (*Pachyramphus polychoterus*)

COMÚN



♂



♀

Primavera /  
verano.

Muy  
vocalizador.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

F: Ré Pablo

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Anambé Grande (*Pachyramphus validus*)



**POCO  
COMÚN**

Bosques  
ribereños,  
selva. Estrato  
alto de estos  
bosques.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tachurí Sietecolores (*Tachuris rubrigastra*)

F: Zapata Ignacio



*juvenil*

F: Capovilla Pablo



**POCO  
COMÚN**

Humedales  
con juncales y  
totorales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Mosqueta Ojo Dorado (*Hemitriccus margaritaceiventer*)

COMÚN

F: Battistino Ricardo



Muy  
vocalizadora,  
durante todo  
el año.

Bosques y  
matorrales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Picochato Grande (*Tolmomyias sulphurescens*)

F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo



**POCO  
COMÚN**

En bosques  
densos en  
buen estado  
de  
conservación.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Piojito Silbón (*Campstostoma obsoletum*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



Vocalización  
muy particular.  
Tanto en el  
campo como  
en la ciudad.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Suirirí Gris (*Suiriri suiriri*)

**COMÚN**

F: Ebel Andrés



En pequeños grupos.  
Suelen vocalizar mucho en las copas de arboles altos.

Más fotos,  
cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Piojito Pardo (*Nesotriccus murinus*)

RARO



F: Capovilla Pablo

Bosque  
Chaqueño en  
buen estado.  
Muy  
vocalizador.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Mosqueta Ceja Amarilla (*Capsiempis flaveola*)

POCO  
COMÚN



F: Capovilla Pablo

En junio de 2018 se la registra por primera vez en la provincia. En tacuarales o picanillares, en bosques densos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

NT

# Tachurí Canela (*Polystictus pectoralis*)



F: Braidotti Adrián



F: Ré Pablo

RARO

Pastizales,  
juncales.  
Los sexos  
difieren en el  
color de su  
plumaje.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*)

RARO

♂



F: Ré Pablo

♀



F: Capovilla Pablo

Pastizales  
húmedos.  
También  
totorales y  
junciales.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*)

RARO



F: Enrique Jesús



F: Enrique Jesús

Pastizales,  
totoral. Se  
destaca su  
color oliva en  
dorsal.

Más fotos,  
cantos y mapa  
de distribución:

Click Aquí

# Doradito Pampeano (*Pseudocolopteryx flaviventris*)

**POCO  
COMÚN**

Hay que  
reconocer su  
canto, clave  
que lo  
distingue del  
siguiente.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

F: Micelli Jorge

F: Capovilla Pablo



# Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*)



F: Enrique Jesús



F: Enrique Jesús

RARO

Es idéntico al anterior. Se debe reconocer por su **canto** para identificarlo correctamente.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Fiofío Corona Dorada (*Myiopagis viridicata*)

F: Luna Horacio



F: Nagel Federico



RARO

En el tercio  
Norte del sitio,  
bosques y  
selvas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Fiofío Copetón (*Elaenia flavogaster*)

RARO

F: La Grotteria Jorge



Difícil distinguir del Fiofío Grande. Su vocalización y forma del copete lo distinguen.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Fiofío Pico Corto (*Elaenia parvirostris*)

COMÚN



En primavera /  
verano.

Más  
escuchado que  
visto.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

# Fiofío Grande (*Elaenia spectabilis*)

F: González Laura



**POCO  
COMÚN**

En primavera /  
verano.  
Más  
escuchado  
que visto.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Fiofío Silbón (*Elaenia albiceps*)



**POCO  
COMÚN**

En otoño e invierno. Más escuchado que visto.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Piojito Gris (*Serpophaga nigricans*)

COMÚN

Cerca del agua, en bordes de canales, lagunas y ríos.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Braidotti Adrián

Click Aquí

# Piojito Tiquitiqui (*Serpophaga subcristata*)

COMÚN



Más  
escuchado  
que visto, se  
distingue del  
siguiente por  
su canto.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Piojito Trinador (*Serpophaga griseicapilla*)



F: Capovilla Pablo

**COMÚN**

Otoño /  
invierno.

Se identifica  
por su canto.  
Corona casi  
sin blanco y  
cola más corta  
que el  
anterior.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Barullero (*Euscarthmus meloryphus*)

**COMÚN**



F: Ré Pablo

Pequeño, muy  
inquieto y  
oculto. Fácil  
de distinguir  
por su canto y  
llamada.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Mosqueta Estriada (*Myiophobus fasciatus*)

COMÚN



Primavera /

verano

Más

escuchada que  
vista.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Mosqueta Parda (*Lathrotriccus euleri*)



F: Capovilla Pablo



F: Battistino Ricardo

POCO  
COMÚN

En bosques  
densos.  
Mandíbula  
enteramente  
clara.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Mosqueta Ceja Blanca (*Cnemotriccus fuscatus*)



POCO  
COMÚN

En bosques  
densos y  
tacuarales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Suirirí Pico Corto (*Sublegatus modestus*)

COMÚN



Más  
abundante en  
primavera y  
verano.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*)

F: Zapata Ignacio



F: Ré Pablo



## COMÚN

Más  
abundante en  
primavera /  
verano.

Los sexos  
difieren en el  
color de su  
plumaje.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Viudita Pico Celeste (*Knipolegus cyanirostris*)

♀



♀



♂



RARA

Pico gris  
ceniza e iris  
rojo bien  
marcado.  
Hembra  
corona rojiza.  
Estriado  
grueso en  
pecho.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Viudita Trinadora (*Knipolegus aterrimus*)

F: Capovilla Pablo



RARA

Solitaria en  
áreas abiertas.  
Hembra  
corona  
grisácea,  
dorso  
pardusco.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: González Elías

Click Aquí

# Sobrepuerto Austral (*Lessonia rufa*)



POCO  
COMÚN

En otoño/  
invierno,  
playas y áreas  
abiertas de  
pasto corto.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pico de Plata (*Hymenops perspicillatus*)

F: Battistino Ricardo

♀



♂



COMÚN

Más abundante en invierno en pastizales, costas y caminos rurales.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Enrique Jesús

Click Aquí

# Suirirí Amarillo (*Satrapa icterophrys*)



**COMÚN**

Solitario o en  
pareja, cerca  
de  
humedales.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

# Monjita Blanca (*Xolmis irupero*)



**COMÚN**

Más  
abundante en  
invierno.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: Capovilla Pablo

[Click Aquí](#)

# Monjita Gris (*Nengetus cinereus*)

F: González Laura

**COMÚN**

Áreas abiertas  
y caminos  
rurales.



Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Monjita Coronada (*Neoxolmis coronatus*)

F: Nagel Federico

POCO  
COMÚN



Áreas abiertas  
en invierno,  
caminos  
rurales,  
sembrados.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Lavandera (*Arundinicola leucocephala*)

F: Ré Pablo



♀

F: Ema Sur



♂

POCO  
COMÚN

Los sexos  
difieren en el  
color de su  
plumaje.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Viudita Lomo Negro (*Fluvicola albiventer*)

COMÚN

F: González Laura



Humedales  
como esteros,  
arroyos y ríos.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Burlisto Castaño (*Casiornis rufus*)

F: Ré Pablo

**RARO**



En primavera/  
verano.

Solitarios en  
bordes de  
bosques.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*)

F: Ré Pablo

**COMÚN**

Primavera /  
verano.

El llamado se  
puede  
confundir con  
el del Fiofío  
Grande

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)



# Burlisto Pico Negro (*Myiarchus ferox*)



POCO  
COMÚN

Reconocer su canto es importante para identificarlo, corona **convexa**, pico totalmente negro.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

F: La Grotteria Jorge

Click Aquí

# Burlisto Cola Castaña (*Myiarchus tyrannulus*)

COMÚN

F: Battistino Ricardo



Muy  
vocalizador.  
En bosques  
densos.  
Filetes rufos  
en alas.  
Corona  
triangular.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Picabuey (*Machetornis rixosa*)

**COMÚN**



También  
llamado  
Domador, por  
pararse sobre  
el lomo de  
caballos y  
vacas.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: Zingerling Maria

[Click Aquí](#)

# Benteveo (*Pitangus sulphuratus*)



**COMÚN**

También  
llamado  
Pitogüé en la  
zona. Muy  
abundante en  
el campo y la  
ciudad.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Pitanguá (*Megarynchus pitangua*)



RARO

En primavera/  
verano en el  
Norte del  
sitio.

Más fotos,  
cantos y mapa  
de distribución:

F: La Grotteria Jorge

Click Aquí

# Benteveo Rayado (*Myiodynastes maculatus*)

**COMÚN**

F: González Laura



En primavera  
y verano, en  
bosques y  
bordes de  
bosques.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tuquito Rayado (*Empidonax varius*)

F: Capovilla Pablo



F: Battistino Ricardo

**POCO  
COMÚN**

Más abundante en palmares.  
Nuca lisa y pico más chico que el anterior.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Tuquito Gris (*Empidonax aurantioatrocristatus*)

F: Ré Pablo



F: Nagel Federico



## COMÚN

Primavera / verano. Estrato alto en bordes de bosques.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Suirirí Real (*Tyrannus melancholicus*)

F: Ré Pablo

**COMÚN**

Se lo observa en primavera y verano. En el estrato alto del bosque.



Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tijereta (*Tyrannus savana*)

F: Capovilla Pablo



**COMÚN**

Se las observa en primavera y verano. En cables, alambrados y áreas abiertas.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Enrique Jesús

Click Aquí

# Juan Chiviro (*Cyclarhis gujanensis*)



F: Sager Maximiliano

**COMÚN**

Más  
escuchado que  
visto. Tanto en  
el campo como  
en la ciudad.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Chiví Común (*Vireo chivi*)



**COMÚN**

Más abundante en primavera/verano. Muy vocalizador.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Urraca Morada (*Cyanocorax cyanomelas*)

F: Nagel Federico



F: Capovilla Pablo



**RARA**

Suele andar  
en bosque  
chaqueño, en  
el Norte del  
sitio.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Urraca Criolla (*Cyanocorax chrysops*)

COMÚN

En pequeños  
grupos en  
bosques  
densos.



Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Angú (*Donacobius atricapilla*)



COMÚN

Suele andar en pareja, en ambientes acuáticos bien vegetados.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Battistino Ricardo

Click Aquí

# Golondrina Zapadora (*Riparia riparia*)

COMÚN



F: Battistino Ricardo



F: Zapata Ignacio

En primavera/verano. Miles suelen volar al ras del agua en los ríos y riachos del sitio. Pico diminuto.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Golondrina Ceja Blanca (*Tachycineta leucorrhoa*)

**COMÚN**

F: Muñoz de Toro Juan



F: Capovilla Pablo



F: Ebel Andrés



Presente todo  
el año, formar  
grandes  
grupos en  
sembrados y  
humedales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Golondrina Patagónica (*Tachycineta leucopyga*)

**COMÚN**

F: González Laura



En otoño e invierno.  
Muy parecida a la anterior,  
sin ceja blanca.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Golondrina Doméstica (*Progne chalybea*)

**COMÚN**

F: Ré Pablo



F: Capovilla Pablo



En Primavera  
y verano. Más  
abundantes  
en pueblos y  
ciudades.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

F: Ebel Andrés




# Golondrina Negra (*Progne elegans*)

F: Durando Miguel



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo



F: González Laura



**POCO  
COMÚN**

En primavera  
y verano,  
junto a otras  
Progne.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Golondrina Parda (*Progne tapera*)



F: Capovilla Pablo

**COMÚN**

En primavera  
y verano.  
Suele nidificar  
en nidos de  
Hornero.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Golondrina Ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*)

F: Borra Gaspar

POCO  
COMÚN

Pequeña,  
asociada a  
ambientes  
acuáticos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí



# Golondrina Barranquera (*Pygochelidon cyanoleuca*)

F: Zapata Ignacio



F: Luna Horacio



**RARA**

Subcaudales negras ayudan  
a su  
identificación  
en vuelo. Mas  
abundante en  
invierno.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Golondrina Cabeza Rojiza (*Alopochelidon fucata*)

**COMÚN**

F: Capovilla Pablo



Presente todo el año, en pequeños grupos.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:


[Click Aquí](#)

# Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*)



F: Braidotti Adrián

F: Muñoz de Toro Juan



F: Capovilla Pablo



**COMÚN**

Más abundante en Primavera y Verano, vuelan al ras el agua en ríos y arroyos..

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Golondrina Rabadilla Canela (*Petrochelidon pyrrhonota*)

POCO  
COMÚN

En primavera  
y verano,  
suele formar  
bandadas  
mixtas con  
otras  
golondrinas.



F: Nagel Federico

F: Capovilla Pablo



F: Nagel Federico

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Tacuarita Azul (*Polioptila dumicola*)



COMÚN

Macho con antifaz negro, suelen andar en pareja tanto en el campo como en la ciudad.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Ratona (*Troglodytes aedon*)

**COMÚN**

También  
llamada  
Tacuarita en el  
sitio.



Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Durán Gustavo

**Click Aquí**

# Ratona Grande (*Campylorhynchus turdinus*)



**POCO  
COMÚN**

Canto  
inconfundible.  
Casi siempre  
en pareja,  
estrato alto.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Capovilla Pablo

Click Aquí

# Calandria Grande (*Mimus saturninus*)



**COMÚN**

Solitaria o en pareja, tanto en el campo como en la ciudad.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

F: Nagel Federico

Click Aquí

# Calandria Real (*Mimus triurus*)



**COMÚN**

Más  
abundante en  
otoño e  
invierno.  
Blanco en sus  
alas y cola.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: Culzoni Dante

Click Aquí

# Zorzal Colorado (*Turdus rufiventris*)

COMÚN



Muy  
caminador en  
el estrato bajo  
de los  
bosques.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Zorzal Chalchalero (*Turdus amaurochalinus*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

Muy  
caminador en  
el estrato bajo  
de los  
bosques.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Gorrión (*Passer domesticus*)



**COMÚN**

**EXÓTICA.**

Más  
abundante en  
zonas urbanas.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

**Click Aquí**

# Cachirla Chica (*Anthus chii*)

COMÚN

F: Muñoz de Toro Juan



F: Nagel Federico

Es muy útil  
para una  
correcta  
identificación  
conocer las  
vocalizaciones  
de las  
cachirlas.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cachirla Goteada (*Anthus correndera*)

POCO  
COMÚN



F: Battistino Ricardo



F: Capovilla Pablo

Las manchas o estrías de los flancos de las cachirlas son útiles para su identificación.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Cachirla Pálida (*Anthus hellmayri*)

F: Beltrocco Eduardo



F: Enrique Jesús



**RARA**

Más  
abundante en  
invierno. Canto  
y llamada  
característicos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Tangará Garganta Negra (*Euphonia chlorotica*)

COMÚN



F: Nagel Federico



F: Capovilla Pablo

Su canto es  
inconfundible.  
Más  
escuchado  
que visto.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Tangará Cabeza Celeste (*Chlorophonia cyanocephala*)



RARO

Otoño /  
invierno.

Se alimenta de  
frutos de  
Ligarias.  
Compone  
bandadas  
mixtas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cabecitanegra (*Spinus magellanicus*)

COMÚN



Son pequeños  
y muy  
vocalizadores.  
Forma  
pequeños  
grupos, a  
veces con  
otras especies.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cachilo Ceja Amarilla (*Ammodramus humeralis*)

COMÚN



F: Enrique Jesús



juvenil

Común en  
caminos  
rurales y  
sembrados.  
Muy  
vocalizador.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cerquero Litoraleño (*Arremon flavirostris*)

COMÚN



Su canto es  
inconfundible,  
es más  
escuchado  
que visto.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

F: Nagel Federico

Click Aquí

# Chingolo (*Zonotrichia capensis*)



**COMÚN**

Común en el campo y la ciudad. En invierno pueden aparecer otras subespecies.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*)

F: Ré Pablo

♂



F: Battistino Ricardo

F: Capovilla Pablo

♀



RARO

Primavera /  
verano.

En pastizales,  
humedales.  
Suele formar  
grandes  
grupos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pecho Colorado (*Leistes superciliaris*)



POCO  
COMÚN

En pastizales,  
suele formar  
grandes  
grupos.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Boyero Negro (*Cacicus solitarius*)

F: Ré Pablo



**COMÚN**

Perseguido por  
cazadores,  
vocalizaciones  
muy variadas.  
Nido largo y  
colgante de  
material de  
color claro.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Boyero Ala Amarilla (*Cacicus chrysopterus*)

COMÚN



Solitario o en  
pareja, en  
bosques  
nativos.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Boyero Cacique (*Cacicus haemorrhoous*)

F: Ré Pablo

RARO



En el extremo  
Norte del sitio.  
En grupos.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Boyerito (*Icterus pyrrhopterus*)

COMÚN

F: Ré Pablo




Hombro con mancha rufa o rojiza. Cola larga, pico fino, recto y cónico.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Tordo Pico Corto (*Molothrus rufoaxillaris*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo

Parásito de  
puesta del  
Tordo Músico  
entre otros..  
se los ve en  
bandadas  
juntos.

Más fotos,  
cantos y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis*)



COMÚN

Parásito de  
puesta,  
Dimorfismo  
sexual. El  
macho más  
brillante que el  
anterior.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Federal (*Amblyramphus holosericeus*)



POCO  
COMÚN

Totorales y  
juncales, muy  
llamativo y  
vocalizador.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Chopí (*Gnorimopsar chopi*)



F: Capovilla Pablo

**POCO  
COMÚN**

Más  
abundante en  
palmares.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Tordo Músico (*Agelaioides badius*)

COMÚN



Suele formar  
pequeños  
grupos y  
bandadas  
mixtas.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: Capovilla Pablo

Click Aquí

# Varillero Negro (*Agelasticus cyanopus*)

COMÚN

♂



F: Capovilla Pablo

♀



F: Capovilla Pablo

Humedales.  
Componen  
bandadas  
mixtas con  
otros  
varilleros.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Varillero Ala Amarilla (*Agelaius thilius*)

F: Battistino Ricardo

♀



♂



**POCO  
COMÚN**

Humedales y  
totorales,  
junto a otros  
varilleros.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Varillero Congo (*Chrysomus ruficapillus*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



Componen bandadas mixtas con otros varilleros. Asociado a humedales.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Pecho Amarillo (*Pseudoleistes virescens*)



**COMÚN**

Gregario, en  
pastizales y  
cortaderales.  
Rabadilla  
parda.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Arañero Cara Negra (*Geothlypis velata*)

F: Capovilla Pablo



**COMÚN**

Su canto es  
inconfundible,  
es más  
escuchado que  
visto.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Pitiayumí (*Setophaga pitiayumi*)

COMÚN



Muy  
vocalizador. En  
boques.

Más  
escuchado que  
visto.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Arañero Coronado Chico (*Basileuterus culicivorus*)

COMÚN



Muy  
vocalizador,  
poco visto.  
Ambientes  
cerrados y  
cañaverales.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

F: La Grotteria Jorge

Click Aquí

# Arañero Silbón (*Myiothlypis leucoblephara*)

COMÚN



Su canto es  
inconfundible,  
es más  
escuchado que  
visto.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Ré Pablo

Click Aquí

# Fueguero (*Piranga flava*)

F: Battistino Ricardo



POCO  
COMÚN

Marcado  
dicromatismo  
sexual. En  
arboledas,  
tanto exóticas  
como nativas  
en el campo y  
la ciudad.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Reinamora Chica (*Cyanoloxia glaucocacaerulea*)



F: La Grotteria Jorge

RARA

Más  
abundante en  
invierno.  
Culmen  
marcadamente  
curvo a  
diferencia de  
la siguiente.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Reinamora Grande (*Cyanoloxia brissonii*)

F: Muñoz de Toro Juan



♀



♂

F: Capovilla Pablo

**COMÚN**

Marcado  
dicromatismo  
sexual.  
Perseguida por  
cazadores.

Más fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cardenal Copete Rojo (*Paroaria coronata*)

F: Capovilla Pablo



F: Vidal Guillermo



**COMÚN**

Los juveniles  
difieren en el  
color de su  
plumaje con  
los adultos.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Cardenilla (*Paroaria capitata*)



F: Ré Pablo



juvenil

COMÚN

Habita en cercanía a humedales. Conocida en la zona como Carmesí.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Tangará Gris (*Thlypopsis sordida*)

F: Capovilla Pablo



F: Ré Pablo



**COMÚN**

En bosque y  
selva, forma  
bandadas  
mixtas.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Monterita Cabeza Negra (*Microspingus melanoleucus*)

F: Enrique Jesús

**COMÚN**



Hembra con  
corona gris.  
Componen  
bandadas  
mixtas.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Frutero Negro (*Tachyphonus rufus*)

COMÚN

♀



F: Sager Maximiliano

♂



F: Nagel Federico

Marcado dicromatismo sexual.  
Mandíbula clara. Los juveniles pueden ser manchados de ambos colores.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Naranjero (*Rauenia bonariensis*)



COMÚN

Marcado  
dicromatismo  
sexual.  
Juveniles  
parecidos a la  
hembra.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Celestino (*Thraupis sayaca*)

F: Capovilla Pablo

**COMÚN**

Muy  
vocalizador,  
suele  
alimentarse de  
frutos nativos y  
exóticos.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Saí Celeste (*Conirostrum speciosum*)



F: Sager Maximiliano

**POCO  
COMÚN**

Estrato alto de bosques. En pequeños grupos y bandadas mixtas.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

# Cachilo Canela (*Donacospiza albifrons*)



F: Zingerling Maria



F: Battistino Ricardo

**POCO  
COMÚN**

Suelen andar  
en parejas.  
Muy  
vocalizadores.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Sietevestidos Pampeano (*Poospiza nigrorufa*)

POCO  
COMÚN



Los juveniles  
difieren en el  
color de su  
plumaje con  
los adultos.

Mas fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Jilguero Dorado (*Sicalis flaveola*)



F: Ronchino Mariela

**COMÚN**

Es común que  
nidifique en  
nidos de  
Hornero.  
Marcado  
dicromatismo  
sexual.



Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

[Click Aquí](#)

# Misto (*Sicalis luteola*)



**COMÚN**

En pastizales,  
cortaderales y  
caminos  
rurales. Puede  
formar grandes  
bandadas.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Coludo Grande (*Emberizoides herbicola*)

F: Capovilla Pablo



F: Luna Horacio



RARO

Habita  
pastizales bien  
conservados.  
Importante  
escuchar su  
canto para su  
correcta  
identificación.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Coludo Chico (*Emberizoides ypiranganus*)



F: Capovilla Pablo



RARO

Los juveniles  
difieren en el  
color de su  
plumaje con  
los adultos.

Habita  
pastizales bien  
conservados.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Verdón (*Embernagra platensis*)



**COMÚN**

Los juveniles  
difieren en el  
color de su  
plumaje con  
los adultos.

Mas fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Volatinero (*Volatinia jacarina*)

COMÚN

F: Durán Gustavo



F: Ré Pablo



En primavera y verano.  
Marcado dicromatismo sexual.  
Juveniles parecidos a las hembras.

Fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Corbatita Overo (*Sporophila lineola*)

♂



F: Nagel Federico

F: González Laura

♀



POCO  
COMÚN

Marcado  
dicromatismo  
sexual.  
Perseguido por  
cazadores.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:


Click Aquí

# Corbatita Blanco (*Sporophila leucoptera*)

COMÚN



F: Capovilla Pablo



F: Nagel Federico

En primavera y verano.  
Marcado dicromatismo sexual.  
Perseguido por cazadores.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Capuchino Canela (*Sporophila hypoxantha*)

F: Battistino Ricardo

♂



F: Battistino Ricardo

♀



## COMÚN

En primavera  
y verano.  
Marcado  
dicromatismo  
sexual.  
Perseguido  
por cazadores.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

NT

# Capuchino Garganta Café (*Sporophila ruficollis*)

F: Capovilla Pablo

♂



♀



F: González Laura

**POCO  
COMÚN**

En primavera y verano.  
Marcado dicromatismo sexual.  
Perseguido por cazadores.

Mas fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

EN

# Capuchino Pecho Blanco (*Sporophila palustris*)

**RARO**

♂



♀



F: La Grotteria Jorge

En primavera y verano.  
Marcado dicromatismo sexual.  
Perseguido por cazadores.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

[Click Aquí](#)

NT

# Capuchino Castaño (*Sporophila hypochroma*)



F: Capovilla Pablo



F: Capovilla Pablo

RARO

Las hembras del género *Sporophila* son muy parecidas entre si. Los machos son más fáciles de distinguir.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Corbatita (*Sporophila caerulescens*)

F: Ré Pablo

♂



F: Battistino Ricardo

♀



COMÚN

En primavera y verano.  
Marcado dicromatismo sexual.  
Perseguido por cazadores.

Más fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Corbatita Dominó (*Sporophila collaris*)

F: Battistino Ricardo

♂



F: Sager Maximiliano

♀



COMÚN

Marcado  
dicromatismo  
sexual.  
Perseguido por  
cazadores.

Fotos, cantos y  
mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Brasita de Fuego (*Coryphospingus cucullatus*)

F: Ré Pablo

♂



F: Ré Pablo

♀



**COMÚN**

Marcado  
dicromatismo  
sexual.

Perseguida por  
cazadores.  
Compone  
bandadas  
mixtas.

Mas fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pepitero Chico (*Saltatricula multicolor*)



POCO  
COMÚN

Componen  
bandadas  
mixtas. En  
caminos  
rurales.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

F: Nagel Federico

Click Aquí

# Pepitero Gris (*Saltator coerulescens*)

COMÚN



Zapata Ignacio



Muy vocalizador. Los juveniles son mayoritariamente verdosos.

Mas fotos, cantos y mapa de distribución:

Click Aquí

# Pepitero Verdoso (*Saltator similis*)

F: Druetto Danilo



COMÚN

Ceja mucho  
mas larga que  
el anterior.  
Alas verdes.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí

# Pepitero de Collar (*Saltator aurantiirostris*)

COMÚN



F: González Laura



F: Sager Maximiliano

Vocalizador,  
perseguido por  
cazadores.  
También  
conocido como  
Juan Chiviro.

Más fotos, cantos  
y mapa de  
distribución:

Click Aquí



# Algunas especies NO registradas en el sitio, pero con registros cercanos a Jaaukanigás:



## Jaaukanigás:




- Macá Gris (*Tachybaptus dominicus*)
- Zorzalito Boreal (*Catharus ustulatus*)
- Vencejo de Tormenta (*Chaetura meridionalis*)
- Picaflor Negro (*Florisuga fusca*)
- Picaflor Garganta Blanca (*Leucocloris albicollis*)
- Burrito Pico Rojo (*Mustelirallus erythrops*)
- Burrito Pecho Gris (*Laterallus exilis*)
- Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*)
- Gaviotín Lagunero (*Sterna trudeaui*)
- Garza Azul (*Egretta caerulea*)
- Bandurria Boreal (*Theristicus caudatus*)
- Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*)



- Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*)
- Aguilucho Alas Anchas (*Buteo platypterus*)
- Halcón Montés Chico (*Micrastur ruficollis*)
- Halcón Negro Chico (*Falco rufigularis*)
- Curutié Ocráceo (*Limnoctites sulphuriferus*)
- Tueré Chico (*Tityra inquisitor*)
- Mosqueta Cor. Parda (*Leptopogon amurocephalus*)
- Doradito Pardo (*Pseudocolopteryx dinelliana*)
- Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)
- Zorzal Sabiá (*Turdus leucomelas*)
- Cachirla Trinadora (*Anthus chacoensis*)
- Frutero Cabeza Negra (*Nemosia pileata*)


# Conocé las MARIPOSAS Y POLILLAS de Jaaukanigás:



(Clik en el ícono)

(Están ordenadas desde la especie más observada a la menos)


# Conocé la FLORA de JAAUKANIGÁS:



(Clik en el ícono)

**(Está ordenada desde la especie más observada a la menos)**


# Conocé los **ANFIBIOS** de Jaaukanigás:



(Clik en el ícono)

**(Están ordenados desde la especie más observada a la menos)**

# Conocé los REPTILES de Jaaukanigás:



(Clik en el ícono)

(Están ordenados desde la especie más observada a la menos)


# Conocé los MAMÍFEROS de JAAUKANIGÁS :



(Clik en el ícono)

(Están ordenados desde la especie más observada a la menos)

# Conocé los HONGOS de JAAUKANIGÁS :




(Clik en el ícono)

**(Están ordenados desde la especie más observada a la menos)**



# Sumá tus registros a las plataformas de ciencia ciudadana !!



# Visitá los proyectos de ciencia ciudadana :

JAAUKANIGÁS

Sitio Ramsar Jaaukanigás

Acerca de

(PROYECTO PARAGUAS que reúne registros de naturaleza del Jaaukanigás).

JAAUKNIGÁS es un humedal ubicado en el río Paraná medio, al noreste de la provincia de Santa Fe, Argentina, en el Departamento General Obligado. Es un complejo de curso, agua, lagunas, estanques, pantanos de agua

Conocer más > Tu membresía

Modifica proyecto Diario del proyecto

Visión de conjunto	OBSERVACIONES	ESPECIES	IDENTIFICADORES	OBSERVACIONES
	7.741	1.567	858	127



Reserva Natural Municipal "Jardín Florido" - Jaauka...

Acerca de

Ubicada al norte de la zona urbana de la ciudad de Florencio, el lugar cuenta con una extensión de 23 hectáreas, y se ubica en las tierras adquiridas por la Municipalidad de Florencio con recursos propios, hace unos años atrás.

Se puede ingresar por calle Iriondo y 25 de

Conocer más > Tu membresía

Modifica proyecto Diario del proyecto

Visión de conjunto	OBSERVACIONES	ESPECIES	IDENTIFICADORES	OBSERVACIONES
	7.741	1.567	858	127



# Agradecemos a los siguientes colaboradores:

Agustini Hernán

Battistino Ricardo

Beltrocco Eduardo

Borra Gaspar

Bosso Andrés

Braidotti Adrián

Contreras Yanina

Culzoni Dante

Churruarín Maximiliano

Druetto Danilo

Durán Gustavo

Durando Miguel

Ebel Andrés

Ema Sur

Enrique Jesús



Galván Carlos

García González Camilo

González Elías

González Laura

González Mora Gonzalo

Giraudo Alejandro

La Grotteria Jorge

Luna Horacio

Martín Claudio

Marull Carolina

Massa Luciano

Merlo Ana

Micelli Jorge

Muñoz de Toro Juan

Murzyla Román

Nagel Federico

Palandri Franco

Petelski Carina

Pic Edgardo Oscar

Quarin Nanci

Ré Pablo

Ronchino Mariela

Ruscitti Natalia

Sager Maximiliano

Simpkins Kathlin


Soria Marcos

Speranza Pablo


Vidal Guillermo

Zapata Ignacio

Zingerling María



AVES ARGENTINAS



# Guía para conocer las aves de Jaaukanigás

Por Pablo Capovilla



Jaaukanigás

